



2da fase en promociones de raigrás

- Promociones estabilizadas con siembra de cultivares mejorados de raigrás: Ribeye; Barturbo; BAR HQ
- Malezas gramíneas (gramón; sorgo de alepo) y hoja ancha controladas
- Uso intensivo del suelo durante todo el año. Oferta balanceada de forraje durante todo el año

Claves:

- Siembra de leguminosas BAR peleteadas en siembra directa o al voleo con el fertilizante
- Uso de dosis bajas de glifosato o graminicidas en febrero para promover regeneración de raigrás.
- Fertilización con N y P todos los años
- Descanso estratégico en otoño para recuperación de plantas perennes y para resiembra desde banco de semillas del suelo
- Retrasar cierre para semillazón de raigrás en primer año de siembra de leguminosas
- Permitir semillazón de Lotus cada dos años




Resultados

- Pergamino
- Bajo dulce, Argialboles
- Siembra de leguminosas al voleo 5 Marzo 2006

Trébol rojo **BarTinto** @ 4 kg/ha ; Lotus tenuis **BarTriunfo** @ 10 kg/ha

- 60 kg/ha DAP + 80 kg/ha SPT
- 2do año promoción Raigrás Barturbo





Impacto productivo

- Producción total MS/ha/año 10 – 20 % superior
- Estacionalidad atenuada
- Producción estival: 2.5 tt MS/ha Diciembre-Febrero
- Mayor calidad de forraje en oferta
- Incremento GDPV promedio 10- 15%
- Efecto aporte N leguminosas:
 - Raigrás incrementa producción en 1.5 – 2.0 tt MS/ha
 - Transferencia a raigrás: 20 kg fijados N/ha en verano
- Menor riesgo de enmalezamiento