

Tabel. Overzicht van raseigenschappen bij zomergerst<sup>1)</sup>

Rubricering <sup>2)</sup>	Rasnaam	Lengte van het stro	Stevigheid van het stro	Vroegheid in de aar komen	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:			Korrelopbrengst kleigrond		Korrelopbrengst zand- en dalgrond		Kwaliteitsgegevens			
						Meeldauw	Netvlekkenziekte	Bladvlekkenziekte	Met ziektenbestrijding	Zonder ziektenbestrijding	Met ziektenbestrijding	Zonder ziektenbestrijding	Brouwkwaliteit	Aandeel volgerst	Eiwitgehalte	Duizendkorrelgewicht
<b>Brouwerstrassen</b>																
A	Concerto	105	6	7	6	9	7	6	101	102	98	99	8	101	101	95
A	Quench	99	7	6	6	9	7	8	99	96	100	98	7	100	97	94
A	Tipple	94	7,5	6	6,5	7	7	7	99	99	96	94	7	100	100	100
B	Calico	93	8	7,5	7	9	6,5	8	96	97	97	98	7	101	101	100
B	Prestige	97	7,5	8,5	7,5	9	6	7,5	90	91	92	91	7	100	107	100
N	Jennifer	98	7,5	8,5	7,5	8,5	7	8,5	98	99	98	102	7	101	105	103
N	Tesla	103	6	6	6,5	9	7	7,5	101	102	103	103	8	99	100	100
<b>Nieuw in rassenlijst 2014</b>																
N	Columbus	102	6,5	8	7	9	7	8	103	103	108	104	8	97	100	96
N	Salome	96	7	7	7,5	9	7	6	100	101	107	105	7	97	100	95
N	Shuffle	106	7,5	7	6,5	9	7	6,5	99	99	101	103	8	103	100	107
<b>Voegerstrassen</b>																
A	Shannon	102	8	8	7	9	7	7	101	101	103	102				
N	Natasia	98	6,5	7	7	7,5	7	8	101	102	103	102				
<b>Rassen in onderzoek (2 jaar)</b>																
	KWS Asta	110	7	7,5	6,5	9	7,5	5	105	103	105	104				
	Odyssey	102	6,5	6,5	6	9	7	8	103	101	105	103				
	Tatum	102	7	8	7,5	9	7	8	102	103	102	107				
<b>100 =</b>		<b>83 cm</b>							<b>9,1 t/ha</b>	<b>8,6 t/ha</b>	<b>7,4 t/ha</b>	<b>6,8t/ha</b>		<b>95,6%</b>	<b>9,5%</b>	<b>49,6 gr</b>

<sup>1)</sup> Raseigenschappen hebben betrekking op de jaren 2010 t/m 2013. In 2013 konden geen gegevens over bladvlekkenziekte worden verzameld. In de tabel staan de ongewijzigde gegevens van 2012. Korrelopbrengsten hebben betrekking op de jaren 2008 t/m 2013. Voor de kwaliteitsgegevens over het aandeel volgerst, het eiwitgehalte en het duizendkorrelgewicht is gebruik gemaakt van gegevens uit de periode 2003 t/m 2012. Lengte van het stro, korrelopbrengsten, aandeel volgerst, eiwitgehalte en duizendkorrelgewicht zijn weergegeven in verhoudingsgetallen. Hoge waarderingscijfers betekenen goede stevigheid van het stro, vroeg in de aar komen, vroeg rijp, goede resistenties, een hoog aandeel volgerst, een hoog duizendkorrelgewicht en een hoog eiwitgehalte.

<sup>2)</sup> Rubricering van de Rassenlijst 2014 : A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras.