




 **BARENBRUG**



Barultima

RAY-GRASS ITALIEN NON ALTERNATIF TÉTRAPLOÏDE



UN RAY-GRASS ITALIEN QUI FACILITE LE CHOIX

Ray-Grass Italien non alternatif tétraploïde

Notre conseil pour réussir

SEMIS

25 à 30 kg / ha

UTILISATION

Mixte Fauche /
Pâture

PÉRENNITÉ

2 à 3 ans

LA GRAMINÉE LA PLUS SEMÉE

Installation très rapide, production abondante et précoce pendant deux ans, il semble normal que le ray-grass italien non alternatif soit l'espèce fourragère la plus vendue en France (chiffres GNIS 2011).

Issue de la recherche Barenbrug la variété **Barultima** type tétraploïde correspond parfaitement à ces critères en y ajoutant une touche plus personnelle : **la qualité à tous les niveaux ! Barultima** c'est la sécurité pour l'éleveur de pâturer ou de réaliser des stocks grâce à une production d'herbe de très bonne qualité, très tôt au printemps et sur le reste de l'année.

BARULTIMA, POUR PRODUIRE EN QUANTITÉ



	RENDEMENT 1 ^{ÈRE} COUPE	
	ANNÉE 2	ANNÉE 3
BARULTIMA	8,35	6,24
CABALLO	7,76	5,94
TONYL	7,90	6,13

- > Plus de 8T de MS dès la 1^{ère} coupe
- > Du stock au printemps
- > De l'herbe en arrière saison
- > De la pérennité !

	RÉPARTITION DE LA PRODUCTION - ANNÉE 2		
	PRINTEMPS	ÉTÉ-AUTOMNE	TOTAL
BARULTIMA	14,8	4,5	18,5
CABALLO	14,0	4,5	17,7
TONYL	14,2	4,1	17,6

	RÉPARTITION DE LA PRODUCTION - ANNÉE 1 À 3		
	1 ^{ÈRE} COUPE	PRINTEMPS	TOTAL
BARULTIMA	14,6	24,1	29,2
CABALLO	13,7	23,0	28,2
TONYL	14,0	23,4	28,3

SOURCE : ESSAIS CTPS

SANS QUALITÉ, LA QUANTITÉ N'EST RIEN

CRITÈRES	BARULTIMA	CABALLO	TONYL
RÉSISTANCE AUX ROUILLES	7,2	5,8	5,6
RÉSISTANCE AUX MALADIES	6,7	5,9	5,3

SOURCE : RÉSULTATS CTPS - 9 = TRÈS RÉSISTANT

- > Les tétraploïdes sont les types pâture par excellence. Tout en feuilles et avec un état sanitaire excellent sur tout le cycle végétatif, **Barultima est d'une haute valeur nutritive**, très apprécié par les animaux. En semis de printemps, c'est l'assurance d'obtenir un fourrage **100% feuillu** et sans épis, consommé en grande quantité.



- > **Barultima** c'est les avantages d'un RGI, espèce qui démarre le plus tôt en sortie d'hiver, jusqu'à 1 mois avant une prairie permanente : **« avec une pâture plus précoce, je limite l'utilisation de mes stocks ».**

Le fourrage conviendra parfaitement pour la production de lait et de viande.

STADES UTILISATIONS	1 ^{ÈRE} POUSSÉ DE L'ANNÉE			REPOUSSE AGÉES DE 5 SEMAINES (PÂTURE)
	DÉBUT MONTAISON (PÂTURE)	DÉBUT ÉPIAISON (ENSILAGE)	PLEINE ÉPIAISON (FOIN)	
UFL	0,99	0,90	0,74	0,83
UFV	0,96	0,84	0,66	0,77
MAT	168	111	84	161
PDI	101	60	65	98

VALEURS ALIMENTAIRES RAY-GRASS D'ITALIE NON ALTERNATIF - SOURCE TABLES INRA 2007

 **BARENBRUG**

BARENBRUG FRANCE S.A. - ZAC Les Portes de la Forêt - 43 allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN - Tél. 01 60 06 81 00 - Fax. 01 60 06 81 13 - E-mail. info@barenbrug.fr

www.barenbrug.fr