

## Høst 2011.

Lokalitet: Ny Lellinge

1. og 2. års forsøg

Høstdato	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
3.08.11	2011-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARCLAUDIA	1193
3.08.11	2011-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARCLAY II	1062
3.08.11	2011-1	Alm. Rajgræs	Plæne	BARMINTON	1310
3.08.11	2011-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARATA	1450
3.08.11	2011-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARGLORIA	1354
3.08.11	2011-1	Alm. Rajgræs	Foder	BARUTTI	1381
3.08.11	2011-1	Alm. Rajgræs	Foder	MELTADOR	1614
3.08.11	2011-1	Alm. Rajgræs	Foder	ROSETTA	1116
Høstdato	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
3.08.11	2011-1	Hundegræs	Foder	BAREXCEL	829
3.08.11	2011-1	Hundegræs	Foder	BARTYLE	894
15.07.11	2011-2	Hundegræs	Foder	BARLEGRO	1199
Høstdato	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
12.07.11	2011-1	Rødsvingel	Plæne	BARUSTIC	1916
12.07.11	2011-1	Rødsvingel	Plæne	BARDIVA	1160
12.07.11	2011-1	Rødsvingel	Plæne	BARLINEUS	733
12.07.11	2011-1	Rødsvingel	Plæne	BARSWING	876
12.07.11	2011-2	Rødsvingel	Plæne	BARANGEL	1922
12.07.11	2011-2	Rødsvingel	Plæne	BARSONATE	2147
Høstdato	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
15.07.11	2011-2	Strandsvingel	Plæne	BARLEXAS II	1857
15.07.11	2011-2	Strandsvingel	Plæne	BARSPIDER	1225
15.07.11	2011-2	Strandsvingel	Plæne	BARVADO	2196
Høstdato	Høstår	Art	Type	Sort	Udbytte kg/ha
	2011-1	Luzerne	OVE	BARALFA	1413

## **Vejrforholdene i Danmark 2010-2011.**

Efteråret var lidt koldere og mere vådt end gennemsnittet. Den første sne kom i den sidste uge af november. Vinteren var koldere end normalt. Det meste nedbør faldt som sne, der dækkede jorden fra begyndelsen af december til slutningen af januar. En kuldeperiode i februar, hvor der ingen sne var til til at beskytte planterne medførte alvorlige skader i mange afgrøder.

April var meget varm og tør, de planter, der først havde lidt af kulden i februar, led nu af varmen og en ikke optimal vandforsyning, bl.a. på grund af et dårligt udviklet rodnet. Senere i april blev alle afgrøder ramt af vandmanglen.

Vækstsæsonen fra maj og indtil høst var våd, så alle afgrøder var velforsynet med vand. Men nedbørs-overskuddet gjorde høsten besværlig og vandindholdet i frøvaren var noget over det normale. Betingelserne for blomstringen i frøgræsserne var rimelige i 2011.